



Droga Usada

Maconha, Marijuana,  
Haxixe, O-9-THC




Principais Sintomas e Sinais  
de Conduta

Tagarelice, excitabilidade,  
risadas ou depressão e  
sonolência. Aumento do apetite  
(doces), olhos vermelhos  
congestos, alucinações,  
distúrbios na percepção do  
tempo e do espaço.

Elementos Acessórios

Odor de relva queimada  
no local. Presença de  
vegetal cinza-esverdeado  
triturado com pequenas  
sementes lisas, restos de  
cigarros feitos à mão e  
odor nas roupas.

| Droga Usada   | Principais Sintomas e Sinais de Conduta  | Elementos Acessórios   |
|---|--|--|
| <p>Estimulantes, Anfetaminas ou "Bolinhas" e Moderadores do Apetite</p>  | <p>Inquietação, excitabilidade, tagarelice constante, confusão mental, falta de apetite com emagrecimento, insônia, conduta agressiva, boca seca com irritação das narinas (secas), alucinações e dilatação da pupila.</p> | <p>Presença de comprimidos, diversos tipos, hábito de fumar cigarros constantemente, inquietação motora (não para quieto).</p> |

Droga Usada

Principais Sintomas e Sinais de Conduta

Elementos Acessórios

Solvente volátil, Cola de Sapateiro ou de Aerodelismo, Limpapapeiros, Lança-perfume, Flúidos de Limpeza, Éter, Clorofórmio, Benzina, "Loló"

Aparência de ébrio, excitação, hilariedade, linguagem enrolada, perda de equilíbrio, olhos vermelhos, nariz escorrendo (constipado), sonolência, inconsciência.

Latas ou bisnagas de cola, frascos de lança-perfume, restos de sólidos ou nódoas em panos, lenços ou sacos plásticos.




| Droga Usada | Principais Sintomas e Sinais de Conduta | Elementos Acessórios |
|-------------|---|----------------------|
|-------------|---|----------------------|


LSD, DMT, STP, Mescalina, Psilocibina, "Chá de cogumelo".

Alucinações, delírios, confusão mental e dificuldade de raciocínio. Risos e choros, atitudes impulsivas e irracionais. Calafrios, tremores, sudorese, pupilas dilatadas, reações de pânico com sensação de deformação no corpo e objetos.

Pequenos comprimidos ou drágeas, cubos de açúcar com manchas, restos de cogumelos (com cheiro de esterco), pequenos frascos.



| Droga Usada   | Principais Sintomas e Sinais de Conduta   | Elementos Acessórios   |
|---|---|--|
| <p data-bbox="104 311 305 368">Cocaína</p>  | <p data-bbox="680 311 1275 756">Excitação, aumento da atividade, agressividade, idéias delirantes com suspeita de tudo e de todos, palidez acentuada e dilatação da pupila.</p> | <p data-bbox="1317 311 1812 979">Septo nasal perfurado e com pequenas hemorragias, pó branco cristalino, objetos metálicos tipo caixa de rapé ou pequenos tubos metálicos.</p> |

| Droga Usada  | Principais Sintomas e Sinais de Conduta  | Elementos Acessórios  |
|--|--|---|
| <p>Ópio, Morfina, Heroína e Narcóticos da Síntese (Algafan), Pembenyl.</p>  | <p>Estupor, analgesia, lacrimejamento, coriza, "pupila em cabeça de alfinete", sonolência.</p> | <p>Pós brancos cristalinos ou escuros, ampolas, frascos de xarope, seringas hipodérmicas e acessórios, agulhas, manchas de sangue na roupa, feridas, cicatrizes e abscessos no corpo, dedos queimados</p> |